

COLÉOPTÈRES NOUVEAUX DE LA FAMILLE DES HYLOPHILIDES,

PAR M. MAURICE PIC.

---

**Tokiophilus** nov. gen.

*Collo nullo, oculis valde emarginatis; antennis infra oculis insertis, gracilibus, articulis pro majore parte globulosis, articulo 3° mediocre et simplice; pedibus gracilibus.*

Ce genre des Hylophilides est très caractérisé par la structure de ses antennes (ces organes rappellent un peu celles du genre *Dasycerus* Brogn.) avec le 2° article globuleux et épaissi, le 3° médiocre et simple, les suivants minces à la base et épaissis globuleusement à l'extrémité, ciliés, dernier à peine plus épais que le précédent : elles sont insérées en avant et un peu en dedans des yeux qui sont très échancrés et transversaux ; la tête est très accolée au prothorax, celui-ci est subtransversal, les pattes sont grêles.

**Tokiophilus applicatus** nov. sp.

*Oblongus, antice attenuatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus, oculis, antennis pro parte nigris, infra corpore pro parte piceo; elytris ad medium et apice nigro fasciatis; capite fortiter et dense punctato; thorace punctato-granulato, postice arcuato-impresso; elytris antice ad saturam distincte impressis, fortiter punctatis.*

Long. : 2 millimètres environ.

Japon : Environs de Tokio, 1906 (J. Harmand).

**Hylophilus tamatavensis** nov. sp.

*Oblongus, nitidus, griseo pubescens, rufus, elytris pallidioribus, antennis ad medium piceis.*

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise écartée, soulevée, roux avec les élytres de coloration plus claire, antennes foncées sur les trois

avant-derniers articles. Tête grosse, à peine plus large que le prothorax, à forte ponctuation, yeux grands, un peu rapprochés en avant et assez distants du bord postérieur de la tête; antennes longues, assez épaisses, dernier article court, tronqué obliquement au sommet; prothorax subcarré, à angles antérieurs arrondis, fortement et assez densément ponctué; élytres assez courts et larges, fortement impressionnés antérieurement, à ponctuation écartée, plus forte en avant; pattes simples et grêles, cuisses postérieures un peu épaissies.

Long. : 3 millimètres.

Madagascar : Tamatave, 1904 (Ch. Alluaud).

Peut se placer près de *H. grandipes* Pic, forme plus robuste, antennes de coloration différente, pattes postérieures un peu épaissies.

#### **Hylophilus simplex** nov. sp.

*Oblongus, pruinosis, testaceus, antennis pedibusque testaceis.*

Oblong, revêtu d'une pubescence pruineuse, testacé, membres compris. Tête plus large que le prothorax, tronquée postérieurement, yeux gris, assez gros, rapprochés du bord postérieur de la tête mais très éloignés entre eux; antennes courtes, épaissies à l'extrémité, dernier article court, tronqué au sommet; prothorax un peu plus long que large, rétréci en avant, faiblement impressionné à la base; élytres un peu plus larges que le prothorax, peu longs, subparallèles antérieurement, à faible dépression antérieure; pattes courtes et minces, postérieures peu plus fortes.

Long. : 2 millimètres environ.

Madagascar : Forêt de la côte Est, 1901 (Ch. Alluaud).

Peut se placer près de *H. mauritiensis* Pic, qui a les élytres ornés d'une macule apicale noire nette.

#### **Hylophilus superbus** v. nov. **trinotatus**.

*Rufus, capite pro parte et thorace antice obscuris; elytris testaceis, antice nigro maculatis, ad medium et postice nigro et undulato bifasciatis.*

Madagascar : Pays Androy Sud, 1900 (Ch. Alluaud)<sup>(1)</sup>.

Variété caractérisée par la coloration spéciale des élytres.

#### **Hylophilus (Elonus) towarensis** nov. sp.

*Oblongus, fere opacus, piceus; antennis pedibusque pro parte rufis; elytris ad humeros et apice rufo notatis.*

(1) Figure aussi dans la collection Pic.

Oblong, presque opaque, courtement pubescent de gris, noir de poix avec les antennes et partie des pattes rousses, élytres marqués de roux aux épaules et vers l'extrémité. Tête courte, derrière les yeux un peu rétrécie puis subtronquée-échancrée, yeux grands, rapprochés en avant et un peu éloignés du bord postérieur de la tête; antennes testacées, assez robustes, longues, à dernier article très long, cylindrique, subacuminé au sommet; prothorax subcarré; élytres larges et courts, fortement impressionnés longitudinalement sur le disque, noir de poix, mais maculés de roux aux épaules et à la suture vers l'extrémité; pattes rousses avec les cuisses et tibias postérieurs en partie foncés, tous les tibias arqués, les quatre cuisses antérieures minces et les postérieures épaissies.

Long. : 3 millim. 5.

Vénézuéla : Colonie Tovar, 1888 (E. Simon).

Voisin de *H. forticornis* Chp., en diffère par les tibias intermédiaires non coulés, mais simplement arqués, le prothorax plus court, la coloration différente des élytres.

#### ***Hylophilus laticeps* v. nov. *brunescentipennis*.**

Modérément large, roux-brunâtre avec l'avant-corps noir, les pattes et antennes testacées. Tête peu plus large que le prothorax, qui est subcarré; élytres pas très larges et relativement longs, impressionnés derrière l'écusson.

Long. : 2 millimètres.

Bolivie : Cochabambø, 1917 (P. Germain).

Diffère de *H. laticeps* Champ., qui ne n'est connu que par la description, au moins par la coloration plus claire des élytres.

#### ***Hylophilus Harmandi* nov. sp.**

*Elongatus, parum nitidus, griseo pubescens, nigro-piceus, antennis pedibusque pro parte testaceis.*

Allongé, peu brillant, revêtu d'une pubescence grise peu serrée et soulevée, noir de poix avec les membres en partie testacés. Tête un peu plus large que le prothorax, tronquée postérieurement, à ponctuation pas très forte, rapprochée, yeux grands, assez éloignés entre eux et ne touchant pas le bord postérieur de la tête; antennes testacées, pas très longues, grêles, à 2° article peu épais, un peu plus court que 3°, celui-ci et suivants allongés et à peu près égaux, dernier peu épais, subtronqué en oblique au sommet; prothorax petit, carré, ponctué comme la tête, à

angles antérieurs arrondis et postérieurs un peu saillants; élytres bien plus larges que le prothorax et longs, subparallèles en avant, fortement déprimés en avant, à ponctuation plus ou moins forte et rapprochée; pattes grêles, les postérieures seulement un peu plus fortes, foncées avec les quatre cuisses antérieures et partie des tarsi testacées.

Long. : 3 millim. 5.

Indes : Dardjeeling.

Sans doute voisin de *H. himalaicus* Chp., coloration différente et forme probablement plus allongée.

**Hylophilus Bonhourii** nov. sp.

*Oblongus, nitidus, griseo pubescens, castaneus; elytris apice testaceis; capite nigro, membris testaceis, pedibus nigro annulatis.*

Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise soulevée, châtain avec la tête foncée, le sommet des élytres, les antennes, palpes et pattes testacées, ces dernières étant annelées de noir sur les tibias, avec les cuisses postérieures un peu rembrunies au sommet. Tête grosse, plus large que le prothorax, tronquée en arrière, yeux très grands, rapprochés en avant et touchant presque le bord postérieur de la tête; antennes longues, pas très fortes, dernier article un peu épaissi et tronqué obliquement au sommet; prothorax subcarré, plus étroit que la tête, à angles antérieurs arrondis, à ponctuation forte et peu écartée; élytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, subparallèles en avant, atténués postérieurement, assez fortement et peu densément ponctués, à dépression antérieure moyenne; cuisses antérieures longues et courbées, tibias un peu arqués, tibias intermédiaires un peu courbés à la base, cuisses postérieures épaissies et tibias un peu épaissis.

Long. : 3 millimètres.

Congo, 1919 (Lefèvre, in coll. Bonhoure).

Voisin de *H. cephalotes* Pic, coloration plus foncée, antennes entièrement testacées, pattes de structure différente.